

Sinais que seu felino pode estar apresentando cistite idiopática

A cistite idiopática felina se apresenta como uma inflamação da vesícula urinária, aguda ou crônica, e é uma das principais causas de doenças do trato urinário inferior dos felinos (GER- BER et al., 2005; DEFAUW et al., 2011).

Apesar de ser um problema muito frequente na clínica sua causa ainda não é bem esclarecida, podendo ocorrer por diversos motivos, um dos fatores predisponentes mais apontado é o estresse, seja ele pela convivência com outros animais, mudanças de rotina ou manejo inadequado. Outros fatores como ambiente, nutrição, sexo e raça também podem ser considerados como hipótese para o desenvolvimento dessa doença (WEISSOVA; NORSWORTHY, 2011).

Alguns sinais que podem ser observados são:

- Urinar em locais inapropriados
- Aumento na quantidade de vezes que o animal urina normalmente
- Dor ao urinar, fazendo com que o animal vocalize ou tenha espasmos
- Presença de sangue na urina
- Depressão
- Anorexia
- Vômito
- Dor a palpação abdominal
- Obstrução

O diagnóstico é feito pelo médico veterinário através de exclusão de outras doenças do trato urinário, histórico do animal e exames físicos e clínicos.

O tratamento é sintomático e pode ser prescrito de forma medicamentosa somado com o melhoramento do manejo ambiental e alimentar, já que esse problema pode estar relacionado ao estresse e ansiedade dos animais, tudo isso é feito junto ao tutor para melhorar as condições em que seu pet vive, as interações com outros animais de seu convívio, limpeza das caixas de areia, fontes de água e enriquecimento ambiental.

Caso o animal apresente obstrução deve passar pelo procedimento de cateterização ou sondagem uretral para o alívio da pressão vesical (PALM; WESTROPP, 2011).

SILVA, A. C. da; MUZZI, R. A. L.; OBERLENDER, G.; MUZZI, L. A. L.; COELHO, M. de. R., HENRIQUE, B. F. Cistite idiopática felina: revisão de literatura. **Arq. Ciênc. Vet. Zool. UNIPAR, Umuarama**, v. 16, n. 1, p. 93-96, jan./jun. 2013.