

Dermatite de Dobra Labial

A dermatite de dobra labial em pets (especialmente cães) é uma inflamação da pele localizada nas dobras ao redor da boca, principalmente nos lábios inferiores e comissuras labiais, onde há acúmulo de umidade, saliva e restos alimentares. É uma condição comum em raças com dobras faciais pronunciadas. É uma dermatite úmida e irritativa, causada pela proliferação de bactérias e fungos em áreas da pele que permanecem constantemente úmidas e pouco ventiladas. Com o tempo, isso gera inflamação, odor desagradável e até infecção secundária.

Entre as principais causas para o surgimento dessa dermatite estão: umidade constante, falta de higiene nas dobras faciais, infecções bacterianas ou fúngicas secundárias, excesso de pele e dobras profundas, alergias cutâneas e predisposto anatômica (como nas raças pug, cocker spaniel, shar pei, shih tzu, entre outros).

Sintomas que você pode observar no seu pet:

Vermelhidão e irritação nas dobras labiais;

Odor forte e fétido;

Coceira e dor ao tocar;

Secreção purulenta;

Crostas ou úlceras na pele;

Animal esfregando muito a boca;

O tratamento é feito visando eliminar a infecção, reduzir inflamação e controlar a umidade no local com limpeza e secagem correta do local, uso de medicamentos tópicos e em casos mais graves medicamentos para terapia sistêmica. É importante também prevenir o surgimento, principalmente em pets predispostos com higiene diária, secando a região, dietas balanceadas e em alguns casos correção cirúrgica para remover excesso de pele.

Referências:

SCHRANMM, L. C.; CARVALHO, V. G. G.; GIOSO, M. A. Dermatite de dobra labial. Anais... São Paulo: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, 2004. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/001399806>. Acesso em: 21 out. 2025.