

## Doença de Lyme

A Doença de Lyme, também chamada de borreliose de Lyme, é uma infecção transmitida por carrapatos que pode afetar cães e outros animais domésticos.

A infecção ocorre ao animal ser exposto à picada de carrapatos contaminados com bactérias do gênero *Borrelia*. No Brasil, diferentes espécies de carrapatos podem estar envolvidas, como o *Rhipicephalus sanguineus*, comum em ambientes urbanos e presente em cães. Ao picar o animal, o carrapato transmite a bactéria para a corrente sanguínea, onde ela pode atingir articulações, órgãos internos e o sistema nervoso.

Os sinais clínicos mais comuns são: febre persistente, letargia, claudicação (mancar), muitas vezes migratória (ora em uma pata, ora em outra), acompanhado de dores articulares ou musculares, linfadenomegalia (aumento dos gânglios linfáticos), podendo evoluir para sinais com alterações oculares como uveíte e problemas neurológicos. O diagnóstico deve ser feito através de exames laboratoriais como a sorologia e o hemograma para investigar a sintomatologia hematológica. O tratamento deve ser instaurado por um médico veterinário com antibióticos e suporte aos sinais clínicos que o paciente apresentar.

Você pode prevenir seu pet utilizando antiparasitários, realizando a limpeza do ambiente em que ele fica, e inspecionando o corpinho para verificar a presença de ectoparasitas.

Referência :

YOSHINARI, M. U.; BACCAN, G. C.; MARANGONI, R. G.;

SOUZA, A. L. Doença de Lyme Símile Brasileira: aspectos clínicos, laboratoriais e terapêuticos em cães. *Clínica Veterinária*, São Paulo, n. 85, p. 36–44, nov./dez. 2010.

*Sophya Kutchma Albuquerque*