

Eclampsia em Cadelas

Muito conhecida por acometer mulheres gestantes na hora ou após o parto, a eclampsia também pode ocorrer em cadelas.

A hipocalcemia puerperal é uma doença metabólica causada por uma rápida queda nos níveis séricos de cálcio no organismo no pré ou pós-parto, devido à alta demanda para a formação óssea do feto, manutenção do organismo materno e a lactação.

A causa pode estar relacionada devido à má nutrição ou nutrição incorreta durante a gestação. Os principais sinais clínicos são: incoordenação, tremores musculares, convulsão, taquicardia (aumento dos batimentos cardíacos), e hipotermia (queda da temperatura, patinhas, focinho e orelha com aspecto gelado ao toque).

Ela é mais comum em fêmeas de raças pequenas, mas pode acometer qualquer raça. É uma afecção grave e deve ser avaliada em emergência por um médico veterinário para fazer o diagnóstico e escolher a melhor forma de estabilizar a paciente e realizar a reposição do cálcio, a melhor profilaxia é a fêmea gestante realizar o pré-natal em acompanhamento nutricional e clínico.

Se você tem um pet gravadinha a espera de filhotes, fique atento e procure orientação médica.

MORAES, Eduarda Carvalho MATA, Gabrielle Mendes da OLIVEIRA, Thais Fernanda de; BLANKEINHEIM, Thalita Masoti; HIPOCALCEMIA PUERPERAL CANINA – RELATO DE CASO; UNILAGO 2021.

disponível em :

<https://revistas.unilago.edu.br/index.php/revistacientifica/article/view/1020/836>