

## Escala da dor em cães

Na medicina humana não há um procedimento padrão para avaliar a dor em seres humanos, porém, é possível perguntar ao paciente se ele está sentindo dor, em qual nível, se a medicação analgésica ajudou a diminuir ou eliminar a dor, o que não é possível com os animais. Por esse motivo, foram desenvolvidas escalas para avaliar a dor, que podem ser útil para você identificar se há algo de errado acontecendo com seu pet.

**Dor 1.** Confortável quando está descansado, se está curioso com os arredores. Sinais de dor começam com inquietação e sensibilidade a ruídos externos.

**Dor 2.** O cão permanece deitado, desconfortável, vocalizando levemente, olhos caídos e não demonstra interesse em interagir.

**Dor 3.** Respiração ofegante, o cão apresenta um comportamento desconfiado, rosnando, chorando, também mantém posição de guarda ou proteção e pouca disposição para se movimentar.

**Dor 4.** Constantemente gemendo ou gritando, irresponsivo, rígido sem se movimentar.

Atenção!

Há diversas escalas para identificar a dor em animais, e algumas são ineficazes para alguns tipos de dor como emocional ou psicológica, dor crônica, osteoartrite e oncológica.

Consulte um médico veterinário.

---

GAYNOR James S; MUIR William; Manual de controle da dor em medicina veterinária, 2.ed. americana 2009.