

Fístula Perianal

É uma doença inflamatória, crônica e progressiva, que afeta a região do tecido anal, perianal e retal dos cães. Podendo ser definida de duas formas: Fistulosa, menos frequente, que causa fístulas pequenas e profundas, e a forma Ulcerativa, que por sua vez causa úlceras extensas e superficiais.

As raças mais acometidas são: Pastor Alemão, Border Collie, Bulldog Inglês, Beagle, Labrador e Sheepdog. Sendo mais comum e machos, a causa pode variar entre colites, traumatismo, reação a corpo estranho, doença autoimune, grande quantidade de glândulas sudoríparas ao redor do ânus.

Os sinais clínicos mais observados são: constipação, dor na região lombar, lambadura, secreção mucopurulenta no local as vezes misturada com as fezes, fezes com sangue.

O diagnóstico deve ser feito a partir de exames físicos como o toque retal e os laboratoriais para descartar outras doenças concomitantes, quanto ao tratamento ele pode variar de terapia medicamentosa com antibióticos e corticoides até o cirúrgico.

Referências:

ASAI Mirian; STURION Marco Aurélio; Fístula perianal em cães – Revisão de literatura Revista de Educação Continuada em Dermatologia e Alergologia Veterinária; 2014.