

## Histoplasmose

Sendo uma doença infecciosa transmissível, a histoplasmose é causada por um fungo chamado de *Histoplasma capsulatum*, ocorre principalmente em ambientes como o galinheiro, terrenos abandonados ou cavernas.

É mais comuns em cães mais jovens e das raças beagle, dachshund e labrador.

Como ocorre a transmissão?

Quando o fungo é eliminado nas fezes de aves ou morcegos, os animais ou seres humanos podem acabar inalando os esporos e sendo contaminados, afetando inicialmente o sistema respiratório.

Quais os sinais clínicos?

- Emagrecimento;
- Animal sem apetite;
- Febre;
- Tosse;
- Falta de ar;
- Dor;
- Mucosas pálidas;
- Convulsões;

Existe tratamento?

Sim, após o diagnóstico feito por um médico veterinário através dos exames adequados o tratamento será feito com a utilização de antifúngicos e outros tratamentos de suporte.

A prevenção é sempre recomendada e pode ser feita evitando o contato dos nossos pets em áreas onde existe grande acúmulo de matéria orgânica, que já foram citadas anteriormente, e também sempre realizar a limpeza de quintais ou os lugares que o pet tenha contato.

Referências:

TELES, A. J. et al. *Histoplasmose em cães e gatos no Brasil*. In: Science and Animal Health, v. 2, n. 1, p. 50-66, 2014.