

Insuficiência cardíaca congestiva

Sendo considerada uma das maiores causas de óbito em cães, a insuficiência cardíaca congestiva (ICC) é muito comum na rotina clínica veterinária, principalmente em animais pré dispostos como os cães das raças boxer, golden retriever, bulldog inglês e poodle, e felinos das raças maine coon, persa e sphynx.

Essa síndrome ocorre com a evolução de uma insuficiência cardíaca que o animal já possui, promovendo um aumento de pressão vascular por conta da congestão.

O que causa essa doença?

A insuficiência cardíaca congestiva é uma síndrome decorrente de outra doença cardíaca que o animal já possui que geralmente estão ligadas a questões genéticas, raciais e de idade.

Os sintomas mais frequentes que você pode observar nos pets são:

- Tosse;
- Dificuldade respiratória;
- Intolerância a exercícios físicos;
- Falta de energia;
- Perda de peso;
- Secreção nasal;
- Distensão do abdômen;
- Vômito;

Quando problemas cardiovasculares são diagnosticados por um médico veterinário de forma precoce, acompanhado de um tratamento adequado colabora com a longevidade e qualidade de vida dos nossos amiguinhos peludos e pode de certa forma prevenir o surgimento da congestão sanguínea.

Referências:

VILASBOAS, C. B.; BARRETO, R.; NETO, M. **Insuficiência cardíaca congestiva em cão: Relato de caso**. Revista Diálogos & Ciência, V. 2, N.1, p. 186-196, Fluxo Contínuo 2022. Acesso em: 18 fev 2024.